El Cóndor de los Andes

(Vultur gryphus)

Fauna en amenaza del territorio CAR

CAR CUNDINAMARCA

Territorio Ambientalmente Sostenible

Director General
Luis Fernando Sanabria Martínez

Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Livia Patricia Leal Maldonado

Director de Recursos Naturales
Richard Giovanny Villamil Malaver

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Diego Alexander Herrera Caipa

Equipo Técnico Gestión del Conocimiento y la Innovación Ambiental
María Juliana Peñalosa Otero
Claudia Marcela López Vargas

Contenidos Pedagógicos
Adriana Beatriz García Hernández

Diagramación y revisión
Diego Alexander Giraldo Cubillos
Sandra Patricia González Cristancho

Diseño e Ilustración
John Fredy Umaña Echeverri

Grupo Biodiversidad Dirección de Recursos Naturales Revisión Técnica
John Eduard Rojas Rojas
Álvaro Enrique Forero
Andrés Mauricio Cortés
Diana Paola Romero C.
Stefani Paola Martínez G.

Asesoría y revisión editorial
Oficina Asesora de Comunicaciones - CAR

Bogotá D.C., Junio
de 2023

Índice

Conoce al Cóndor de los Andes..... **4**
¿Cómo se comporta el Cóndor?..... **6**
Lugares en que se encuentra el Cóndor..... **8**
Interacciones del Cóndor..... **10**
Amenazas del Cóndor..... **12**
Acciones para proteger al Cóndor..... **14**
Bibliografía..... **15**
Comparando el Cóndor con la Tingua y el Cucarachero..... **16**

Conoce al Cóndor de los Andes

El Cóndor de los Andes es el ave ntacional de Colombia, habita en la cordillera de los Andes y es reconocida por su gran tamaño.

Representa la libertad y soberanía.

Nombre: Cóndor de los Andes

Otros nombres comunes:
Buitre o Cuervo

Nombre científico:
Vultur gryphus

Familia: Cathartitae

Origen: Andes Suramericanos





Generaciones: 3

El Cóndor de los Andes puede tener una vida muy larga, alcanzando en promedio los 50 años de edad o más cuando viven en un entorno natural.

Sabías que...
La hembra tiene ojos rojos y brillantes y no posee la cresta carnosa que destaca al macho.

Por ser tan grande y pesado, para poder moverse, prefiere reposar en las alturas de los acantilados empinados de los Andes, y así aprovechar una corriente térmica fuerte para elevarse. Cuando hay buenas condiciones, puede volar hasta 300 kms en un solo día, elevándose hasta los 5.000 metros de altura.

Descripción

Sonidos: se llama Siseo, aunque algunos especialistas dicen q ue este sonido no tiene nombre porque carece de laringe y por eso no emite sonidos ni cantos como lo hacen las otras especies de aves.

Es una especie endémica andina.



Las plumas: se distingue por su brillante plumaje negro azulado y una "gargantilla" de plumas blancas alrededor de la base del cuello.

La cola: siempre presenta plumas negras.

Las patas: son grandes de color café oscuro, dedos fuertes, pero con uñas cortas y redondeadas, que le permiten desgarrar su alimento.

Tamaño: el ave alcanza hasta 3.3 metros de amplitud (distancia medida de extremo a extremo, con las alas extendidas), su altura va desde 1.1 a 1.3 metros de altura (distancia medida del pico a la base de la cola).

El pico: es ganchudo, grande y muy fuerte. Su forma y disposición le permiten desgarrar el alimento.

La cabeza: no tiene plumas y es de color rojo pálido. Los machos presentan cresta y las hembras no.

Peso: entre 8 y 15 kilos

¿Cómo se comporta el Cóndor?

Los cóndores son muy sociables y forman grupos de varios individuos, aunque, en ocasiones, se observan cóndores solitarios o en parejas. Se muestran curiosos y mansos ante la presencia de los hombres, no son agresivos.

Reproducción:

El Cóndor conserva una pareja a lo largo de toda su vida. Una vez se aparean, la hembra solo colocará un huevo cada dos o tres años, el polluelo nacerá a los 56 o 60 días de la postura y los padres lo alimentaran y cuidaran durante 2 y 3 años. Luego de ese período, el joven cóndor andino se integrará al resto de los ejemplares.

Anidación:

Anidan en las grietas o cuevas de las altas montañas, depositando un huevo de color blanco sobre las rocas o areniscas del lugar. Tanto el macho como la hembra cuidaran de la cría, la cual permanecerá en el nido entre 6 y 8 meses.

Alimentación:
El Cóndor es un animal exclusivamente carroñero, esto quiere decir que no mata ni caza para comer, sino que se alimenta de cadáveres de animales.

El descenso de un Cóndor hacia el suelo, alerta a los demás sobre la probable existencia de alimento y así es que varios suelen agruparse sobre las carroñas.

Consume primero las vísceras y luego se dedica a comer la carne de piernas y brazos, al final, dejan el esqueleto limpio, armado y en perfecto estado.

También dejan restos de cuero, que son consumidos por otros animales, como perros y zorros.

Sabías que...

Su comida favorita son los cadáveres de mamíferos de gran tamaño. Para ubicar la carroña, detecta su olor gracias al gas que despiden los cuerpos de los animales en descomposición.



Lugares en que se encuentra el Cóndor

El Cóndor se localiza a lo largo de toda la cadena montañosa de los Andes, donde se ubica nuestro país, Colombia. En la jurisdicción CAR habita en las altas y majestuosas montañas de los páramos de Sumapaz y Chingaza, hábitat enmarcado por altitudes superiores a los 3.000 metros, con espacios abiertos o despejados de vegetación y altas cumbres rocosas.

Recorre grandes distancias, por ejemplo, en un día, puede desplazarse entre un dormidero y el siguiente casi 200 kms lineales o también puede recorrer la misma distancia buscando alimento.









Territorio CAR

Habita entre los **3.500 y los 5.000 msnm,** en las montañas andinas.

Debido a la inmensa área geográfica que recorre, el Cóndor de los Andes depende de las corrientes ascendientes de aire caliente, para planear en lo alto durante largos periodos de tiempo y por largas distancias. El Cóndor no domina el arte de volar hasta que cumple siete meses de edad.

Sabías que...

Los cóndores viven en los bosques alto andinos y en los páramos, en estos lugares las corrientes de aire les permiten planear sin esforzarse.

Interacciones del Cóndor

Cuando los Cóndores descienden para alimentarse, generalmente encuentran a otras especies de carroñeros en el lugar. Estos se unen pacíficamente a los otros animales y en ocasiones deben luchar para apartarlos.

Los Gallinazos Cabecirrojos o Gualas suelen llegar primero al lugar donde se encuentra la carroña, seguidos por los Gallinazos Cabecinegros o Chulos, y finalmente, los Cóndores.

Guala
(Cathartes aura)

Chulo
(Coragyps atratus)



Sabías que...

El Cóndor es uno de los gigantes de América, llegan a medir 3 metros de altura.

Es considerado el ave voladora más grande y pesada que existe en el mundo.

Amenazas del Cóndor

Está clasificado en "Peligro Crítico". La cantidad de nacimientos es muy baja y se reduce aún más con amenazas como los depredadores naturales que se alimentan de los huevos y la caza "deportiva".

Sin embargo, se están haciendo campañas de educación para impedir la cacería y programas de crianza en cautiverio, que devuelven a las aves a su hábitat natural tiempo después.

EXTINTA	EX
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE	EW
EN PELIGRO CRÍTICO	CR ◀
EN PELIGRO	EN
VULNERABLE	VU
CASI AMENAZADA	NT
PREOCUPACIÓN MENOR	LC
DATOS INSUFICIENTES	DD
NO EVALUADA	NE

Resolución 1912 de 2017 **Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible** MADS

Caza

Deforestación

Contaminación

Sabías que...

El Cóndor ha sido amenazado por la cacería, deforestación (pérdida de su hábitat), contaminación del aire, agua y comida, y la severa reducción de su fuente de alimento (animales muertos).

Acciones para proteger al Cóndor

- Ayudando a conservar y mantener el lugar donde vive.
- Compartiendo con amigos y familiares sobre el comportamiento de la especie como carroñera y no depredadora.
- Evitando acciones que atenten contra los ecosistemas: talar, quemar, cazar y contaminar el agua y el aire.
- No utilizar sustancias tóxicas en los lugares dónde el Cóndor habita.

¿Y tú que harías por proteger al Cóndor de los Andes?

Bibliografía

(Plan Nacional de Conservación de Cóndor de los Andes, 2006)(Hilty & Brown, 1986)
(Olivares, 1963)
(Gailey & Bolwig, 1973)
(Gómez, 1992)
(Olivares, 1963)
(Pianka 1970; Ricklefs, 1973)
(Gómez, 1992)
(Olivares, 1963)
(Gailey & Bolwig. 1973; Cabrera 1980)
(Dioguardi 2003; Jácome 2000)
(Gailey & Bolwig, 1973)
NT referencia 2016

Comparando el Cóndor con la Tingua y el Cucarachero

El Cóndor de los Andes

(Vultur gryphus)

Tamaño: 3.3 metros de ancho con las alas extendidas y entre 1.1 a 1.3 metros de altura.
Peso: Entre 8 y 15 kilos.

Tingua moteada

(Porphyriops melanops bogotensis)



Tamaño: 28 cms de altura.
Peso: entre 500 y 800 gramos.

Cucarachero de apolinar

(Cistothorus apolinari)



Tamaño: 3 cms de altura.
Peso: Entre 10 y 12 gramos.

Generaciones: 3,5
Edad promedio: 50 años y 80 años.



Categoría de amenaza:CR

Generaciones: 3
Edad promedio:18 años

Categoría de amenaza:EN

Generaciones: 3
Edad promedio: 10 a 12 años



Categoría de amenaza:CR



Fauna en amenaza del territorio CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Avenida Calle 24 (Esperanza) # 60 - 50, Centro Empresarial
Gran Estación, costado Esfera - Pisos 6 y 7
(Bogotá, D.C.)
2023

www.car.gov.co